

Alkoholrelaterad dödlighet (ålderstandardiserat) per 100.000 invånare, efter kommun, ålder (totalt 15- år), tid och kön, åren 2001-2005

Källa: Statens folkhälsoinstitut 2009-05 28

| | kvinnor | män |
|----------------|---------|------|
| Upplands-Väsby | 13,4 | 55,3 |
| Järfälla | 12,6 | 41,4 |
| Ekerö | 12,6 | 21,2 |
| Upplands-Bro | 17,3 | 61,5 |
| Sollentuna | 16,1 | 25,7 |
| Sundbyberg | 28,6 | 105 |
| Solna | 17,2 | 80,2 |
| Sigtuna | 8,8 | 54,2 |

Medelvärde för respektive år. Antal döda per 100 000 invånare. Medelfolkmängden 15 år och äldre har använts i beräkningarna.

Sjukdomar och dödsfall med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak registreras enligt ICD-klassifikationssystemet ICD-10 (International Classification of Diseases) och omfattar diagnoser som alkoholpsykos, alkoholberoende, alkoholbetingad levercirrhos, alkoholförgiftning och alkoholrelaterade olycksfall. Den registrerade dödligheten utgjorde 1998 två tredjedelar av motsvarande dödlighet 1975. I absoluta tal dog det i slutet av 1990-talet ca 2000 personer per år.

Diagnoser ICD-10: E244, F10, G312, G621, G721, I426, K292, K700-K709, K860, O354, P043, Q860, T510-T519, Y901-Y909, Y911-Y919, Z502, Z714.

